

ÍNDICE DE CULTIVOS


1. [Olivo](#)
2. [Almendro](#)
3. [Cerezo](#)
4. [Viña](#)
5. [Pistacho](#)
6. [Cítricos](#)
7. [Fresa](#)
8. [Melocotón](#)
9. [Manzana](#)
10. [Pera](#)

11. [Aguacate](#)
12. [Arándano](#)
13. [Granado](#)
14. [Tomate](#)
15. [Melón](#)
16. [Sandía](#)
17. [Berenjena](#)
18. [Calabacín](#)
19. [Lechuga](#)
20. [Pepino](#)

21. [Pimiento](#)
22. [Cereal](#)
23. [Maíz](#)
24. [Espárrago](#)
25. [Algodón](#)
26. [Tabaco](#)
27. [Remolacha](#)
28. [Patata](#)
29. [Soja](#)
30. [Colza](#)


FICHA MUESTREO OLIVO

VOLVER



Época de
muestreo

Mes de julio o La parada invernal
(noviembre – febrero)



Parte de la
planta a mues

Hojas con peciolo bien desarrolladas de la parte
central de los brotes dela año, situados a media
altura en la parte externa del árbol.



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

En 1 ó 2 Has. Representativas, tomar unas 10 hojas por
árbol al azar. Tomar unas 250 hojas por muestra que
provengan de al menos 25 árboles.


FICHA MUESTREO ALMENDRO

VOLVER



Época de
muestreo

Mes de julio (8-12 semanas después
de la floración)



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas agrupadas alrededor de la
yema latente (rosetas)



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

En 1 ó 2 Has. representativas, tomar 10 hojas por árbol,
seleccionando los árboles en diagonales o filas. Tomar
unas 250 hojas por muestra que provengan de al menos
25 árboles

FICHA MUESTREO CEREZO

VOLVER



Época de
muestreo

Julio – Agosto



Parte de la
planta a mues

Hojas del año de la parte central bien
desarrolladas



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas de al menos 25
árboles




FICHA MUESTREO VIÑA

VOLVER




Época de
muestreo

Floración (Mayo – Junio)
Envero (Agosto – Septiembre)



Parte de la
planta a
muestrear

Limbos con peciolo de hojas
opuestas a algún racimo



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

80–100 limbos foliares de una parcela
representativa escogida para el muestreo


FICHA MUESTREO PISTACHERO

VOLVER




Época de
muestreo

Julio – Agosto



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas de las ramas que no contengan
fruto



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas de al menos 25
árboles


FICHA MUESTREO CÍTRICOS

VOLVER




Época de
muestreo

Octubre – Noviembre



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas de 6 – 7 meses de ramas
que no tengan fruto



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas de al menos 25
árboles


FICHA MUESTREO FRESA

VOLVER



Época de
muestreo

Durante la frutificación, al principio
de la cosecha



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas


FICHA MUESTREO MELOCOTONERO

VOLVER



Época de
muestreo

Mes de julio (8-12 semanas después
de la floración)



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas completamente desarrolladas con peciolo,
de la parte central de los brotes del año.



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

En 1 ó 2 Has. Representativas, tomar unas 10 hojas por
árbol al azar. Tomar unas 250 hojas por muestra que
provengan de al menos 25 árboles.




FICHA MUESTREO MANZANO

VOLVER



Época de
muestreo

Mes de julio (8-12 semanas después
de la floración)



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas completamente desarrolladas con peciolo,
de la parte central de los brotes del año.



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

En 1 ó 2 Has. Representativas, tomar unas 10 hojas por
árbol al azar. Tomar unas 250 hojas por muestra que
provengan de al menos 25 árboles.




FICHA MUESTREO PERAL

VOLVER



Época de
muestreo

Mes de julio (8-12 semanas después
de la floración)



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas completamente desarrolladas con peciolo,
de la parte central de los brotes del año.



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

En 1 ó 2 Has. Representativas, tomar unas 10 hojas por
árbol al azar. Tomar unas 250 hojas por muestra que
provengan de al menos 25 árboles.


FICHA MUESTREO AGUACATE

VOLVER



Época de
muestreo

Septiembre – Octubre



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas maduras de ramas sin fruto
situadas a mitad de copa.



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas con peciolo por
muestra de una zona representativa


FICHA MUESTREO ARÁNDANO

VOLVER



Época de
muestreo

3 semanas antes de cosecha



Parte de la
Planta
a muestrear

Hojas maduras de la temporada



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas con peciolo por
muestra de una zona representativa


FICHA MUESTREO GRANADO

VOLVER



Época de
muestreo

Abril



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas de las ramas del año.
Octava hoja desde el ápice



Orientación
de la toma
de muestras

En todas las orientaciones del
árbol




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas de al menos 25
árboles


FICHA MUESTREO TOMATERA

VOLVER



Época de
muestreo

Desde el comienzo de la
floración



Parte de la
planta a
muestrear

3ª o 4ª hoja desde el ápice



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas por muestra
de una zona representativa


FICHA MUESTREO MELÓN

VOLVER




Época de
muestreo

Mitad del desarrollo



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas más jóvenes totalmente
desarrolladas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas con peciolo
por muestra de una zona
representativa

FICHA MUESTREO SANDÍA

VOLVER



Época de
muestreo

Mitad del desarrollo



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas más jóvenes totalmente
desarrolladas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas con peciolo
por muestra de una zona
representativa

FICHA MUESTREO BERENJENA

VOLVER



Época de
muestreo

Crecimiento vegetativo



Parte de la
planta a
muestrear

Cuarta, quinta hoja desde el
ápice



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

20 – 25 Hojas

FICHA MUESTREO CALABACÍN

VOLVER



Época de
muestreo

Crecimiento vegetativo



Parte de la
planta a
muestrear

Quinta hoja desde el ápice



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

20 – 25 Hojas


FICHA MUESTREO LECHUGA

VOLVER



Época de
muestreo

Crecimiento vegetativo



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas completas, jóvenes o
internas, medias y externas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Tamaño de la muestra 10 hojas (formación
del cogollo) ó 20 hojas (plantas pequeñas)


FICHA MUESTREO PEPINO

VOLVER



Época de
muestreo

Crecimiento vegetativo



Parte de la
planta a
muestrear

Quinta, sexta hoja desde el
ápice



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

20 – 25 Hojas




FICHA MUESTREO PIMIENTO

VOLVER



Época de
muestreo

Durante la floración



Parte de la
planta a
muestrear

Plantas adultas. Quinta o sexta hoja con
pecíolo empezando por arriba, evitar hojas
adultas



Orientación
de la toma
de muestras



Cantidad de
muestra

Tomar unas 100 hojas con pecíolos
por muestra de una zona
representativa




FICHA MUESTREO CEREALES

Trigo




Avena



Época de
muestreo

Floración: Abril



Parte de la
planta a
muestrear

Segunda y tercera hoja comenzando por la
punta de crecimiento.



Cebada



Arroz



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Parte superior de 40 – 50 plantas
recorriendo dos diagonales en X


FICHA MUESTREO MAÍZ

VOLVER




Época de
muestreo

Después de la polinización, desde que
aparecen las sedas de la inflorescencia
femenina (mazorca). JUNIO



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas enfrente y debajo de la espiga
(mazorca).



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Unas 50 hojas tomadas al azar en una superficie
homogénea de 1 a 2 has. a lo largo de dos
diagonales en **X**


FICHA MUESTREO ESPARRAGUERA

VOLVER



Época de
muestreo

Septiembre



Parte de la
planta a
muestrear

30 cm superiores de las
ramas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

20 – 25 ramas


FICHA MUESTREO ALGODÓN

VOLVER



Época de
muestreo

Julio



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas maduras del tallo
principal



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas



FICHA MUESTREO TABACO

VOLVER



Época de
muestreo

Vegetativa – antes de
floración



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas desarrolladas



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

20 – 25 hojas




FICHA MUESTREO REMOLACHA

VOLVER



Época de
muestreo

Mayo – Agosto



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas con peciolo adultas del
interior



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

100 – 200 hojas


FICHA MUESTREO PATATA

VOLVER



Época de
muestreo

A principio de la floración



Parte de la
planta a
muestrear

4^a o 5^a hoja con peciolo desde
la punta superior



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Una hoja por planta de al menos 50 plantas.
Seleccionar una zona homogénea


FICHA MUESTREO SOJA

VOLVER



Época de
muestreo

En crecimiento vegetativo la parte superior de la planta. En floración, las hojas maduras (trifoliadas)



Parte de la
planta a
muestrear

Parte aérea. Hojas maduras
sin peciolo.



Orientación
de la toma
de muestras




Cantidad de
muestra

Por cada 2 has. de 50 a 100 plantas
cruzando la parcela en diagonal.


FICHA MUESTREO COLZA

VOLVER



Época de
muestreo

Antes de la formación de la
semilla



Parte de la
planta a
muestrear

Hojas recién maduras



Orientación
de la toma
de muestras



Cantidad de
muestra

Unas 50 hojas tomadas al azar en una superficie
homogénea de 1 a 2 has. a lo largo de dos
diagonales en **X**